

## Leçon 213 - Espaces de Hilbert. Bases hilbertiennes. Exemples et applications.

On se place dans E un  $K$ -espace vectoriel avec  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ .

### 1. Généralités sur les espaces de Hilbert. —

#### 1. Espaces préhilbertiens et de Hilbert, exemples. —

- Def : Produit scalaire : forme sesqui-linéaire sur H hermitienne, définie positive.
- Def : Espace préhilbertien : espace vectoriel muni d'un produit scalaire
- Ex : Sur  $\mathbb{R}^n$ , pour  $A \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ ,  $\langle X, Y \rangle := X^t.A.Y$  est un produit scalaire.
- Ex : Sur  $\mathbb{C}^n$ ,  $\langle X, Y \rangle := X^t \bar{Y} = \sum_i x_i \bar{y}_i$  est un produit scalaire.
- Pour  $(X, \mathbb{A}, \mu)$  espace mesuré,  $L^2(X) := \mathbb{L}^2(X, \mathbb{C})/N$  est préhilbertien pour  $\langle f, g \rangle := \int_X f(x) \overline{g(x)} d\mu(x)$ .
- Si  $X = \mathbb{N}$  et  $\mu$  est la mesure de comptage,  $l^2(\mathbb{N}) := L^2(\mathbb{N})$  a pour produit scalaire :  $\langle u, v \rangle := \sum_n u_n \bar{v}_n$ .
- $(C([0, 1], \mathbb{K}), \langle \cdot, \cdot \rangle_{L^2})$  est préhilbertien.
- Pro : Le produit scalaire induit une norme sur l'espace vectoriel.  $N(x) = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ .
- Pro : On a :  $N^2(x+y) - N^2(x) - N^2(y) = \operatorname{Re}(\langle x, y \rangle)$  et  $N^2(x+iy) - N^2(x) - N^2(iy) = \operatorname{Im}(\langle x, y \rangle)$ .
- Pro : Identité du parallélogramme :  $N^2(x+y) + N^2(x-y) = 2(N^2(x) + N^2(y))$
- Thm : Une norme provient d'un produit scalaire ssi elle vérifie l'identité du parallélogramme.
- Thm : Inégalité de Cauchy-Schwarz :  $|\langle x, y \rangle| \leq N(x)N(y)$  avec égalité ssi  $(x, y)$  est  $\mathbb{R}$ -liée.
- App : Ainsi, pour  $\Phi_y(x) := \langle x, y \rangle$ ,  $\|\Phi_y\| = N(y)$ . L'application  $y \in E \mapsto \Phi_y \in E'$  est donc une isométrie.
- Def : E est un espace de Hilbert ssi il est préhilbertien et complet pour la norme engendrée par son produit scalaire.
- Ex :  $\mathbb{R}^n$  avec  $\langle X, Y \rangle := X^t.A.Y$ ,  $L^2(X)$ ,  $l^2(\mathbb{N})$  sont des espaces de Hilbert.
- Contre-Ex :  $(C([0, 1], \mathbb{K}), \langle \cdot, \cdot \rangle_{L^2})$  n'est pas un espace de Hilbert car  $x \mapsto x_n$  est de Cauchy mais ne converge pas dans  $C([0, 1], \mathbb{K})$ .
- Contre-ex :  $\mathbb{R}[X]$  muni de  $N(P) := \sup_{[0,1]} |P(x)|$  est préhilbertien non Hilbert.

#### 2. Orthogonalité, familles orthogonales. —

- Def : Orthogonalité  $x \perp y \Leftrightarrow \langle x, y \rangle = 0$ .
- Def : Pour  $A \subset E$ ,  $A^\perp$ . C'est un sous-ev de E.
- Pro :  $A^\perp = (\overline{\operatorname{Vect}(A)})^\perp = (\overline{\operatorname{Vect}(A)})^\perp$ , et est toujours fermé.
- Pro :  $A \subset (A^\perp)^\perp$ . On a  $B \subset A \Leftrightarrow A^\perp \subset B^\perp$ .
- Pro :  $\overline{\operatorname{Vect}(A)} \cap A^\perp = \{0\}$
- Pro : Formule de Pythagore : Pour  $x \perp y$ ,  $N(x)^2 + N(y)^2 = N(x+y)^2$ .
- Def : Famille orthogonale : Une famille dont tous les éléments sont orthogonaux 2 à 2.
- Def : Famille orthonormée : Les éléments sont orthogonaux 2 à 2 et de norme 1.

- Pro : Une famille orthogonale est libre.
- Ex : La base canonique de  $\mathbb{R}^n$  est orthonormée pour  $\langle X, Y \rangle = \sum_i x_i \bar{y}_i$ .
- Dev : Théorème de Grothendieck : Soit  $(X, \mathbb{A}, \mu)$  un espace probabilisé et F un sous-espace vectoriel de  $L^\infty(X)$  fermé pour  $\|\cdot\|_p$  pour un  $1 \leq p < +\infty$ . Alors F est de dimension finie.

#### 3. Projection sur un convexe fermé. —

- Théorème de projection sur un convexe fermé : Soit C un convexe fermé. Alors pour tout  $x \in E$  il existe un unique  $p(x) \in C$  tel que pour tout  $y \in C$  on ait :  $\langle x - y, p(x) - y \rangle \geq 0$ .
- Pro : On a aussi  $\|x - p(x)\| = d(x, C)$ .
- Pro : On a  $|p(x) - p(y)| \leq |x - y|$ . L'application de projection est 1-Lipschitzienne, donc continue sur E.
- Pro : Si C est un s-ev fermé, alors p est linéaire, donc linéaire continue.
- Cor : Pour F un s-ev de E,  $E = \overline{F} \oplus F^\perp$ .
- Pro : Un espace F est dense dans E ssi  $F^\perp = \{0\}$ .
- Théorème de Hahn-Banach géométrique.
- Pro : Expression du projeté orthogonal sur un s-ev de dimension finie dont on a une base orthonormée.
- App : Procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt.

#### 4. Théorème de Riesz et conséquences. —

- Théorème de représentation de Riesz : Pour tout F forme linéaire continue sur E, il existe  $y \in E$  tel que  $\forall x \in E, F(x) = \langle x, y \rangle$ .
- Thm : Hahn-Banach analytique : Pour F un s-ev de E et f une forme linéaire continue sur G pour N, il existe g une forme lin cont sur E qui prolonge f, et telle que  $\|f\| = \|g\|$ .
- App : Définition de l'adjoint d'une appli lin cont :  $A^* \operatorname{tq} \forall x, y \in E, \langle Ax, y \rangle = \langle x, A^*y \rangle$ .
- Def : Convergence faible.
- Pro : La limite faible est unique.
- Pro : Convergence forte implique convergence faible.
- Pro : Une suite qui converge faiblement a au plus une valeur d'adhérence. Elle converge ssi elle en a exactement une. Une suite faiblement convergente qui converge en norme vers sa limite faible est convergente.
- Contre-ex :  $(e_n)_n$  converge faiblement vers 0 dans  $l^2(\mathbb{N})$  mais ne converge pas vers 0.
- Théorème de Banach-Alaoglu : La boule unité dans un Hilbert est faiblement compacte.

### 2. Bases Hilbertiennes, exemples et applications. —

#### 1. Définitions et exemples. —

- Def : Base hilbertienne.

- Rem : Différence avec les bases algébriques.
- Ex :  $(e_n)_n$  est une base hilbertienne sur  $L^2(\mathbb{N})$ , la base canonique de  $\mathbb{K}^n$ .
- Thm : Existence d'une base hilbertienne dénombrable pour un espace de Hilbert séparable.
- Cor : Tous les espaces de Hilbert séparables sont isométriquement isomorphes à  $l^2(\mathbb{N})$ .
- Cor : Un espace de Hilbert est séparable ssi il possède une base hilbertienne dénombrable.
- App : Pour E Hilbert séparable, décomposition d'un élément dans une base hilbertienne (la suite des coeffs étant dans  $l^2(\mathbb{N})$ , donc convergence  $l^2$ .)

## 2. Base hilbertienne de Fourier. —

- On regarde  $\mathbb{T} := \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ , et  $L^2(\mathbb{T})$  avec  $\langle f, g \rangle := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x)\overline{g(x)}dx$ .
- Def : On définit  $e_n(t) := e^{int} \forall n \in \mathbb{Z}$ . C'est une famille orthonormée.
- Def : Pour f  $2\pi$ -périodique et de carré intégrable, on définit  $c_n(f) := \langle f, e_n \rangle$ .
- Def : Définition de  $D_N, F_N$ .
- Théorème de Féjér :  $F_N * f = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} S_n(f)$  converge uniformément vers f pour tout f  $2\pi$ -périodique continue.  
Donc Vect( $e_n$ ) est dense dans  $L^2(\mathbb{T})$  car  $C_c^0(\mathbb{T})$  est dense dans  $L^2$ . Donc  $(e_n)_n$  base hilbertienne de  $L^2(\mathbb{T})$ .
- Donc pour toute  $f \in L^2(\mathbb{T})$ ,  $\|f\|_2^2 = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n(f)|^2$ .
- Ex : Pour f holomorphe sur  $\mathbb{D}$ ,  $\forall 0 < r < 1$ ,  $\int_0^1 |f(re^{2\pi it})|^2 dt = \sum_{n \geq 0} |a_n|^2 r^{2n}$ .
- Pour f  $2-\pi$ -périodique, paire, telle que  $f(x) = \chi_{[0, \pi/2[} - \chi_{] \pi/2, \pi]}$  sur  $[0, \pi]$ , la formule de Parseval donne :  $\sum_k \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$ . On en déduit  $\sum_k \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$ .
- Pour f  $2-\pi$ -périodique, paire, telle que  $f(x) = |x|$  sur  $] -\pi, \pi[$ , la formule de Parseval nous donne :  $\sum_k \frac{1}{(2k+1)^4} = \frac{\pi^4}{96}$ . On en déduit  $\sum_k \frac{1}{k^4} = \frac{\pi^4}{90}$ .
- Formule sommatoire de Poisson : Soit f de classe  $C^1$  telle que  $f(x) = O(\frac{1}{x^2})$  et  $f'(x) = O(\frac{1}{x^2})$ .  
Alors la fonction  $S(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(t+n)$  est bien définie, continue, et 1-périodique, et la fonction  $f^*(n) = \int_{\mathbb{R}} f(x).e^{-2i\pi nx} dx$  est bien définie, et l'on a :  
$$S(t) = \frac{1}{a} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} f^*(n) e^{im2\pi t}$$

## 3. Polynômes orthogonaux. —

- Def : On appelle fonction poids une fonction  $\rho : I \rightarrow \mathbb{R}$  mesurable, strictement positive, telle que  $\forall n \int_I |x|^n \rho(x) dx \leq +\infty$ .
- Def : On note  $L^2(I, \rho)$  l'espace des classes de fonctions de carré intégrable pour la mesure de densité  $\rho$  par rapport à la mesure de Lebesgue. Muni de son produit scalaire  $\int_I f(x)\overline{g(x)}\rho(x)dx$ , c'est un espace de Hilbert contenant les fonctions polynômiales.
- Pro : Il existe une unique famille  $(P_n)_n$  de polynômes unitaires orthogonaux deux à deux, vérifiant  $\deg(P_n) = n$ , que l'on appelle "famille des polynômes orthogonaux

- associée à  $\rho$ . On l'obtient en appliquant le procédé de Gram-Schmidt à la famille  $(X^n)_n$ .
- Ex : Polynômes de Hermite, de Lagrange, de Chebychev.
- App : Polynômes de meilleure approximation.
- Thm : S'il existe  $a > 0$  tq  $\int_I e^{a|x|}\rho(x)dx \leq +\infty$ , alors  $(P_n)_n$  est une base hilbertienne de  $L^2(I, \rho)$ .

## 3. Espaces de Hilbert à noyau de reproduction : Les espaces de Hardy et de Bergman. —

- Def : Soit X un ensemble et H un espace de Hilbert de fonctions de  $X \rightarrow \mathbb{C}$ . H est un espace de Hilbert à noyau de reproduction ssi il existe  $K : \mathbb{D} \times \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$  tel que  $k_z(\cdot) := \overline{K(z, \cdot)} \in B^2(\mathbb{D}) \forall z \in \mathbb{D}$  et tel que  $f(z) = \langle f, k_z \rangle \forall f \in B^2(\mathbb{D}), z \in \mathbb{D}$ .
- Pro : Un espace de Hilbert de fonctions a un noyau de reproduction ssi les opérateurs d'évaluation  $\delta_z : f \mapsto f(z)$  sont continus  $\forall z \in X$ .
- Théorème : Le noyau de reproduction caractérise l'espace de Hilbert : Si on se donne un noyau de reproduction K, alors il existe un unique  $(H, \|\cdot\|)$  hilbert de fonctions  $X \rightarrow \mathbb{C}$  dont K est le noyau de reproduction.
- Dev : L'espace de Bergman  $B^2(\mathbb{D}) := \{f \in Hol(\mathbb{D}) \text{ tq } f \in L^2(\mathbb{D})\}$  est un espace de Hilbert pour  $\|\cdot\|_2$ , dont une base orthonormée est la famille des  $e_n(z) = \sqrt{\frac{\pi}{n+1}} z^n$ .  
 $f \in Hol(\mathbb{D})$  est dans  $B^2(\mathbb{D})$  ssi pour  $f(z) = \sum_n a_n z^n$  on a  $(\frac{a_n}{\sqrt{n+1}})_n \in l^2$ . On a une condition d'intégrabilité qui ne porte que sur les coeffs du DSE en 0.  
L'espace de Bergman est un espace de Hilbert à noyau de reproduction. Son noyau de reproduction est  $K_B(z, w) = \frac{\pi}{(1-z\bar{w})^2}$ .
- Rem : Ainsi, on obtient beaucoup de propriétés sur  $B^2(\Omega)$  grâce à l'étude de son noyau de reproduction, qui a une forme simple ici.
- Rem : On peut aussi définir  $B^p(\mathbb{D})$  pour  $1 \leq p < +\infty$  et ramener certaines études sur les  $B^p$  à une étude sur  $B^2$  afin de profiter de son caractère hilbertien.
- Pour  $\Omega$  un ouvert simplement connexe, on peut aussi définir  $B^p(\Omega)$  grâce à l'existence de  $\psi : \mathbb{D} \rightarrow \Omega$  biholomorphismes. Cette définition est indépendante de  $\psi$ , et  $B^2(\Omega)$  va lui aussi être un espace de Hilbert à noyau de reproduction, avec un noyau de reproduction que l'on obtient à partir de celui de  $B^2(\mathbb{D})$ . On peut ainsi exporter des propriétés de  $B^2(\mathbb{D})$  vers  $B^2(\Omega)$ .
- Def : On définit  $H^2(\mathbb{D}) = \{\sum_n a_n z^n \text{ tq } (a_n)_n \in l^2(\mathbb{N})\}$  l'espace de Hardy du disque.
- Pro : L'espace de Hardy du disque est un espace de Hilbert pour  $\langle f, g \rangle = \sum_n a_n \cdot \overline{b_n}$ .  
On a de plus :  $\langle f, g \rangle = \lim_{r \rightarrow 1^-} (\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(re^{it})\overline{g(re^{it})} dt)$ .  
Une base orthonormée de  $H^2(\mathbb{D})$  est  $z \mapsto z^n$ .
- Pro : C'est lui aussi un espace de Hilbert à noyau de reproduction pour  $K_H(z, w) = \frac{1}{1-z\bar{w}}$ .

- Pro : On peut injecter  $B^2(\mathbb{D})$  et  $H^2(\mathbb{D})$  dans  $L^2(\mathbb{D})$ . Pour  $P_B$  et  $P_H$  les projecteurs orthogonaux de  $L^2(\mathbb{D})$  sur  $B^2(\mathbb{D})$  et  $H^2(\mathbb{D})$ , on a :  $P_B(f)(z) = \langle f, \overline{K_B(z, \cdot)} \rangle$  et  $P_H(f)(z) = \langle f, \overline{K_H(z, \cdot)} \rangle$ ,  $\forall f \in L^2(\mathbb{D})$ ,  $\forall z \in \mathbb{D}$ .
- Thm : Dans un espace de Hilbert de fonctions à noyau de reproduction, si un opérateur de composition  $C_\varphi : f \mapsto f \circ \varphi$  est bien défini, alors il est continu.
- Thm : Pour tout  $g : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$  holomorphe,  $\forall f \in B^2(\mathbb{D})$ ,  $f \circ g \in B^2(\mathbb{D})$ . Idem pour  $H^2(\mathbb{D})$ .

### Références

Hirsch-Lacombe : I).II)1),II)2),II)3)

Objectif Agrégation : Contre-ex à  $F \oplus F^\perp$ , polynômes de meilleure approximation. Coefficients de Fourier. Polynômes orthogonaux.

Zavidovique : Théorème de Grothendieck. (Dev)

Bayen, Margaria : Espace de Bergman. (Dev)

Gourdon : Séries de Fourier.

Candelpergher : Equation de la chaleur sur le cercle.

---

May 9, 2017

Vidal Agniel, *École normale supérieure de Rennes*