

Suites de polygones

Théorème. Soit P un polygone à n sommets représenté par un vecteur de $\mathbb{C}^n$ des affixes des sommets de P . On définit par récurrence une suite de polygones (P_k) avec $P_0 = P$ et où les sommets de P_{k+1} sont les milieux des arêtes de P_k . Alors (P_k) converge vers l'isobarycentre de P .

Lemme. (Déterminant circulant)

Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$ une matrice circulante donnée par

$$A = \begin{bmatrix} a_0 & a_1 & \dots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & \dots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \dots & a_0 \end{bmatrix}$$

Si on pose $P = a_0 + a_1 X + \dots + a_{n-1} X^{n-1}$ et $w = \exp\left(\frac{2i\pi}{n}\right)$ alors $\det(A) = \prod_{i=0}^{n-1} P(w^i)$.

Preuve du lemme.

On considère la matrice $J = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$, alors

par un simple calcul, on obtient pour $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$,

$$J^k = \begin{bmatrix} 0 & I_{n-k} \\ I_k & 0 \end{bmatrix} \text{ et donc } A = a_0 J^0 + a_1 J^1 + \dots + a_{n-1} J^{n-1} = P(J).$$

Par le calcul précédent, on a $J^n = I$, de sorte que le polynôme $X^n - 1$ qui est scindé et à racines simples annule J . Ainsi, J est diagonalisable avec

$$\text{sp}(J) \subseteq \{1, w, w^2, \dots, w^{n-1}\}$$

Diagonalisons $\mathcal{J}$: le système $\mathcal{J}x = w^i x$, pour un $i \in [0, n-1]$ est :

$$\begin{cases} x_2 = w^i x_1 \\ x_3 = w^i x_2 \\ \vdots \\ x_1 = w^i x_n \end{cases} \quad \text{ce qui est équivalent à} \quad \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \in \text{Vect} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ w^i \\ w^{2i} \\ \vdots \\ w^{(n-1)i} \end{bmatrix} \right)$$

donc $\mathcal{J}$ se diagonalise en $\mathcal{J} = SDS^{-1}$ avec

$$S = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & w & w^2 & \dots & w^{n-1} \\ 1 & w^2 & w^4 & \dots & w^{2(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & w^{n-1} & w^{2(n-1)} & \dots & w^{(n-1)^2} \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & w & & & \\ & & w^2 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & w^{n-1} \end{bmatrix}$$

et donc $A = SP(D)S^{-1} = S \begin{bmatrix} P(1) & & & \\ & P(w) & & \\ & & \ddots & \\ & & & P(w^{n-1}) \end{bmatrix} S^{-1}$, d'où la conclusion.

Preuve du théorème

On a

$$P_{h+1} = \begin{bmatrix} z_1^{h+1} \\ \vdots \\ z_n^{h+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{z_1^h + z_2^h}{2} \\ \vdots \\ \frac{z_n^h + z_1^h}{2} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & \dots & \frac{1}{2} \end{bmatrix}}_{:= A} \underbrace{\begin{bmatrix} z_1^h \\ z_2^h \\ \vdots \\ z_n^h \end{bmatrix}}_{P_h}$$

donc $\boxed{P_h = A^h P_0}$. Maintenant, en remarque que A

est circulaire $A = \text{circ}(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0, \dots, 0)$ associée donc au polynôme $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}X$. Ainsi, A se diagonalise en

$$A = S \begin{bmatrix} 1 & & & \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{2}w & & & \\ & \ddots & & \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{2}w^{n-1} & & & \end{bmatrix} S^{-1}$$

Ainsi

$$A^h = S \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & (\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\omega)^h & & \\ & & \ddots & \\ & & & (\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\omega^{n-1})^h \end{bmatrix} S^{-1}$$

or, pour tout $i \in [1, n-1]$, $|\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\omega^i| < \frac{1}{2}(1 + |\omega^i|) = 1$
 stricte (cas d'égalité impossible car $\omega^i \neq 1$ si $n \nmid i$)

donc $(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\omega^i)^h \xrightarrow{h \rightarrow \infty} 0$

et donc $A^h \rightarrow S \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & & & 0 \end{bmatrix} S^{-1}$.

Calculons S^{-1} : On remarque que $\bar{S}$ est normale et donc les vecteurs propres associés à des vp distinctes sont $\perp$

d'où ${}^*SS = \begin{bmatrix} *1 & & 0 \\ & *2 & \\ & & \ddots \\ 0 & & & *n \end{bmatrix}$. Or, $\langle c_i, c_i \rangle = \sum_{j=1}^n \omega^{(j-1)i} \bar{\omega}^{(j-1)i} = \underline{n}$
 de $\bar{S}$

Ainsi, ${}^*SS = nI$ et donc $S^{-1} = \frac{1}{n} {}^*S = \frac{1}{n} \bar{S} = \frac{1}{n} \bar{S}$.

Conclusion. $A^h \rightarrow S \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & & & 0 \end{bmatrix} S^{-1} = \frac{1}{n} \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{bmatrix}$ (simple calcul)

$$\text{D'où } P_h = A^h P_0 \xrightarrow{h \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\beta_1 + \beta_2 + \dots + \beta_n}{n} \\ \vdots \\ \frac{\beta_1 + \beta_2 + \dots + \beta_n}{n} \end{bmatrix}$$

Ainsi, les polygones P_h convergent vers le "polygone" constant réduit au point $\frac{\beta_1 + \dots + \beta_n}{n}$, l'isobarycentre des polygone de départ.