

# Formule sommatoire de Poisson

Leçons : 241, 246, 250

## Théorème 1

Si  $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ , et  $\hat{f} : x \mapsto \int_{\mathbb{R}} f(t)e^{-2i\pi tx} dt$ , alors

$$\forall x \in \mathbb{R}, \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \hat{f}(n)e^{inx} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(x+n)$$

**Démonstration.** Soit  $G : x \mapsto \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(x+n)$ .

- **$G$  est continue** : en effet, soit  $M > 0$  tel que  $|f(x)| \leq \frac{M}{x^2}$  pour  $|x| \geq 1$ . Alors si  $K > 0$ , et  $x \in [-K, K]$ , on a pour tout  $|n| \geq K$ ,  $|f(x+n)| \leq \frac{M}{(x+n)^2} \leq \frac{M}{(|n|-|x|)^2} \leq \frac{M}{(|n|-K)^2}$  qui est le terme général positif d'une série convergente. Donc  $G$  est la somme d'une série de fonctions continues convergeant normalement sur tout segment, donc est continue.
- **$G$  est  $\mathcal{C}^1$**  : en répétant ce raisonnement, on voit que  $\sum_{n \in \mathbb{Z}} f'(x+n)$  converge normalement sur tout segment de  $\mathbb{R}$  donc le théorème de dérivation terme à terme nous assure que  $G$  est  $\mathcal{C}^1$  et  $\forall x \in \mathbb{R}, G'(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f'(x+n)$
- **$G$  est 1-périodique** : si  $x \in \mathbb{R}$ ,  $G(x+1) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(x+n+1) = \sum_{p=-\infty}^{+\infty} f(x+p)$  par un changement d'indice  $p = n+1$ , soit  $G(x+1) = G(x)$ .

La fonction  $G$  vérifiant les conditions du théorème de convergence normale des séries de Fourier (continue périodique et  $\mathcal{C}^1$  par morceaux), elle est somme de sa série de Fourier sur  $\mathbb{R}$ .

Mais si  $n \in \mathbb{Z}$ , le  $n$ -ième coefficient de Fourier de  $G$  est

$$\begin{aligned} c_n(G) &= \int_0^1 G(x)e^{-2i\pi nx} dx = \int_0^1 \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(x+n)e^{-2i\pi nx} dx \\ &\stackrel{\text{CV normale}}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left( \int_0^1 f(x+n)e^{-2i\pi nx} dx \right) \\ &\stackrel{u=x+n}{=} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left( \int_n^{n+1} f(u)e^{-2i\pi nu} du \right) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(u)e^{-2i\pi nu} du = \hat{f}(n) \end{aligned}$$

En d'autres termes,  $\forall x \in \mathbb{R}, \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(x+n) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \hat{f}(n)e^{inx}$

□

## Proposition 2

Si  $s > 0$ ,

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-\pi n^2 s} = \frac{1}{\sqrt{s}} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-\pi n^2 / s}$$

**Démonstration.** Soit  $\alpha > 0$  et  $f : x \mapsto e^{-\alpha x^2}$ . Si  $n \in \mathbb{Z}$ ,

$$\hat{f}(n) = \int_{\mathbb{R}} e^{-\alpha t^2} e^{-2i\pi n t} dt \stackrel{u=\sqrt{\alpha}t}{=} \frac{1}{\sqrt{\alpha}} \int_{\mathbb{R}} e^{-u^2} e^{-2i\pi n u / \sqrt{\alpha}} du = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{-\frac{1}{4} \left(\frac{2\pi n}{\sqrt{\alpha}}\right)^2} = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{-\pi^2 n^2 / \alpha}$$

(transformée de Fourier d'une gaussienne)

Donc par la formule de Poisson, 
$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \sqrt{\pi \alpha} e^{-\pi^2 n^2 / \alpha} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha n^2}$$

En posant  $s = \frac{\pi}{\alpha}$ , on obtient le résultat désiré. □

### Proposition 3

La distribution tempérée  $\delta_{\mathbb{Z}} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta_n$  est invariante par transformation de Fourier.

**Démonstration.** Cette distribution est bien définie car si  $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ ,  $\langle \delta_{\mathbb{Z}}, f \rangle = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} f(k)$  qui est une série convergente selon la formule de Poisson.

Elle est tempérée car si  $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$  
$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} |f(k)| \leq \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+k^2} \|(1+x^2)f\|_{\infty} = C(\|f\|_{\infty} + \|x^2 f\|_{\infty})$$
 avec  $C$  constante.

Enfin,  $\langle \hat{\delta}_{\mathbb{Z}}, f \rangle = \langle \delta_{\mathbb{Z}}, \hat{f} \rangle = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \hat{f}(k) \stackrel{\text{Poisson}}{=} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} f(k) = \langle \delta_{\mathbb{Z}}, f \rangle$  donc  $\hat{\delta}_{\mathbb{Z}} = \delta_{\mathbb{Z}}$ . □

**Remarque.** • Il faut se souvenir de la transformée de Fourier d'une gaussienne (cf "Inversion de Fourier") :

- La deuxième application est plutôt pour la leçon 250 qui inclut la transformation de Fourier des distributions.
- La distribution  $\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \delta_k$  est tempérée si et seulement si il existe  $C > 0$  et  $N \in \mathbb{N}$  tel que  $\forall k \in \mathbb{Z}, |a_k| \leq C(1+|k|)^N$  (BONY 2001, p. 171).
- On peut déduire de la deuxième application la formule d'inversion de Fourier, c'est dans LESFARI 2012.

### Références :

- Xavier GOURDON (2009). *Les maths en tête : analyse*. 2<sup>e</sup> éd. Ellipses, p. 277 pour le théorème et la première application.
- Michel WILLEM (1995). *Analyse harmonique réelle*. Hermann p. 149 pour la deuxième application.